



MATTINARO

Info zaadfirma	Teeltrichtlijnen Mattinaro (enzazaden.com)
Vruchtgewicht	160 à 180 gram
Los of tros	los
Stengeldichtheid	Belicht: start 2.7 naar 3 stengels/m ² Onbelicht: start 2.5 naar 2.75 stengels/m ²
trossnoei	(4 à) 5
Onderstam	Maxifort of DRO141
	Toppen op 2 ^{de} of 3 ^{de} blad
Teeltgebied	Belgie

RASBESCHRIJVING:

Bij getopt geënte planten, kunnen de scheuten ongelijk of helemaal niet doorkomen. Er is discussie rond het toppen op het 3^{de} blad wat de slaagkans op 2 goede scheuten bevordert. Er zijn wisselende ervaringen. Mattinaro ontwikkelt vrij snel een stevige stamdikte. Het aantal bloemen per tros is normaal +/- 6 à 7. Bij de minste verstoring van het evenwicht ontstaan er kleinere trossen (minder bloemaanleg). Een voornacht helpt om het aantal bloemen per tros op niveau te houden. Indien goed gesnoeid (lees:5) dan zal er steeds voldoende bloem zijn. De ruime kopafstanden impliceren dat de nachten niet "te" koud moeten zijn. Het gewas is tijdens de aanvangsfase teelt, eerder "vol". Het wordt aangeraden vanaf trosbloei 3 een blaadje in de kop te verwijderen. Voor plantingen van 15/1 zal dit eerder vanaf trosbloei 1 reeds zijn om het vol af te leiden naar de trosontwikkeling. Tijdens de zomer (vanaf half mei) kan het gewas "open" worden. Er wordt geen blad uit de kop gehaald tijdens de zomermaanden. Afhankelijk van gewasstand kan er vanaf augustus terug een blad uit de kop gehaald worden. De plantkleur is vrij donker. Er zijn weinig misvormde vruchten.

ZWAKKE/STERKE PUNTEN:

- Gevoelig voor Macrolophus (Nesidiocorus) prikschade.
- Gevoelig voor wankleurig, bij start/ einde van de teelt.
- Weinig gevoelig voor neusrot, zeker in vergelijking met zijn voorganger Kanavaro.

TEELTTIPS:



Lycopersicon

- Gewas vraagt veel energie, zeker in de aanvangsfase van de teelt.
- De doorkleuring vraagt aandacht. Een goed evenwicht in het gewas (aantal stuks, plantbelasting tov gewas) voorkomt de meeste problemen. De meeste bedrijven doseren een vrij hoge kali/calcium gift (10/6 mmol/liter).
- Na het toppen moet er vlot blad worden weggehaald, aangezien het blad zeer groot kan worden waardoor er te weinig licht op de vruchten valt en de doorkleuring bemoeilijkt wordt. In de aanloop naar het rijp maken is extra doseren van kalisulfaat en minder calciumnitraat aan te raden.
- De laatste 7 trossen moet opnieuw gebeugeld worden. Kniktrossen zijn een valkeul.

Lycopersicon.